


5 - 8 OCTOBRE 2021

6^{ÈME} CONGRÈS DE
LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE
DE NÉPHROLOGIE, DIALYSE
ET TRANSPLANTATION
TOULOUSE
SFNDT

WWW.CONGRES.SFNDT.ORG

Réponse immunitaire humorale après Vaccination contre la COVID19 au sein d'une cohorte française de patients hémodialysés (COVADIAL)

C. Loheac*, Quimper - M. Rifaat, Quimper - F. Lavainne, Saint-Herblain - J. Potier, Cherbourg - H. Boulay, Vannes - C. Deltombe Nantes - M. Francois, Tours - G. Goussard, Poitiers - A. Haddj-Elmrabet, Rennes - M. Monge, Paris - G. Belliard, Lorient - I. Segalen, Brest - A.H. Querard, La Roche Sur Yon - N. Saidani, Quimper



5 - 8 OCTOBRE 2021

6^{ÈME} CONGRÈS DE
LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE
DE NÉPHROLOGIE, DIALYSE
ET TRANSPLANTATION
TOULOUSE



WWW.CONGRES.SFNDT.ORG

RGCT			
ulonephrite	15,7 %	12,7 %	
Baseline	14,4 %	17,8 %	
ension	23,5 %	23,5 %	
)	2,0 %	6,0 %	
	44,4 %	38,9 %	
	42,7 %	38,2 %	0,31
ictif	18,6 %	11,1 %	0,013
auto-immune	10,1 %	6,1 %	0,08
intation d'organe solide	20,9 %	10,4 %	<0,001
sur vaccination VHB	58,5 %	73,9 %	0,002
Caractéristiques de dialyse			
epuis la mise en dialyse,	5,7 a	5,4 a	0,71
ifiltration	57,3 %	50,9 %	0,11
le dialyse (heures/semaine),	11,2	11,5	0,05
equate de dialyse (KtV \geq 1,2)	86,5 %	81,1 %	0,11
nt par EPO	92,3 %	86,6 %	0,049
obine (g/dL), moyenne	11,01	11,20	0,10
tes (G/L), moyenne	6,45	6,42	0,91
cytes (G/L), moyenne	0,91	1,20	<0,001
e (g/dL), moyenne	34,5	36,2	<0,001
nine (g/dL), moyenne	0,31	0,29	0,054
(L), moyenne	11,9	8,10	<0,01
(ng/mL), moyenne	440	384	0,03
globulines (g/L), moyenne	8,61	9,53	0,003
	27,85 %	45,88 %	<0,001
	7,59 %	4,84 %	0,178
après schéma vaccinal	0,63 %	1,08 %	0,62

Non	1	-	
Oui	4,57	(2,21 à 9,43)	<0,001
Oui	1	-	
Non	1,91	(1,12 à 3,24)	0,017
Moderna	1	-	
Pfizer	2,62	(1,50 à 4,59)	0,001
\geq 30	1	-	
<30	2,42	(1,06 à 5,52)	0,036
\geq 8	1	-	
<8	2,38	(1,42 à 3,97)	0,001
\geq 1	1	-	
<1	4,05	(2,38 à 6,92)	<0,001

Déterminants associés à une faible
séroconversion (< 265 BAU/mL)
analyse multivariée