

4 - 7 OCTOBRE 2022

7<sup>ÈME</sup> CONGRÈS DE  
LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE  
DE NÉPHROLOGIE, DIALYSE  
ET TRANSPLANTATION

SFNDT  
COUVENT DES JACOBINS  
RENNES

WWW.CONGRES.SFNDT.ORG

## Le fardeau d'anxiété chez les patients hémodialysés chroniques

00407


Ayed.A 1, Gati.M 1, Hadj Brahim.M 1, Trimech.C 1, Jaballah.L 1, Ben Alaya.H 1, Echouk.A 1, Elati.Z1  
1Chu Taher Sfar Mahdia - Mahdia (Tunisie)

**Introduction:** Complexité croissante des comorbidités chez les patients hémodialysés chroniques (HDC) → affectation davantage de la santé et de la qualité de vie (QDV) de ces patients.

**But:** évaluer la prévalence de l'anxiété chez les patients HDC et leur impact sur leur QDV.

**Méthodes:** étude transversale monocentrique questionnaire auto-administré de l'inventaire d'anxiété de Beck (BAI).  
Autoévaluation de santé avec l'échelle visuelle analogique EQ (EQ-VAS).

Age	54 ± 15 ans
Sex ratio	1,17
Diabète	36,5%
EQ-VAS < 50	33%



EQ-VAS	BAI
52 ± 21	BAI > 8
70 ± 21	BAI < 8
<b>P= 0,005</b>	

facterus liés à l'anxiété

Diabète	0,05
inflammation	0,06
Faible niveau socioéconomique	0,04
Prurit +	0,03
Dialyse inadéquate	0,04

### Conclusion

L'anxiété est un symptôme courant chez les patients dialysés et il semble être lié à un état de santé plus mauvais. Le dépistage et le traitement précoces de l'anxiété peuvent avoir un impact positif sur l'issue des patients.