

Locus de contrôle spécifique à la santé chez le l'insuffisant rénal, (étude comparative entre les patients souffrants d'une insuffisance rénale aiguë et les patients souffrants d'une insuffisance rénale chronique)

Rabia Okbani ¹, Djamila Djahida Batouche ², Miloud Lahmer ³, Najet Bezaid ¹, Nadia Benata ²

¹Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed , Laboratoire De Recherche En Psychologie Et Science De L'éducation - Oran (Algérie), ²Faculté De MédecineOran / Laboratoire De Recherche Lerner - Oran (Algérie), ³Centre De Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle Crasc - Oran (Algérie)



Introduction

Les croyances sur le locus de contrôle de la santé désigne que les individus croient que leur état de santé est sous leur propre contrôle ou est sous le contrôle de forces extérieures. L'insuffisance rénale peut affecter le lieu de maîtrise des malades ce qui altère leur équilibre psychique.

L'enquête vise à identifier le niveau du locus de contrôle de la santé et les types de lieux de maîtrise chez les patients atteints d'une insuffisance rénale aiguë ou chronique.

Méthodes

L'étude est effectuée au centre de dialyse à Oran du 05 au 10 juin 2022 auprès de 30 patients insuffisants rénaux (IRA et IRC) par l'échelle de locus de contrôle qui comprend deux dimensions : orientation sur le locus de contrôle interne et le locus sous le contrôle des forces extérieures.

Résultats

Les résultats indiquent que 50 % de l'échantillon souffrent d'une IRA, la moyenne d'âge de la population est égale à 51,5 ans, 56,66 % sont des femmes, 43,33% sont des hommes, la moyenne de la durée de l'atteinte de la maladie est égale à 4,60 ans. Le niveau de locus de contrôle est moyen pour les patients des deux types de l'insuffisance rénale avec une moyenne de 3,57 pour les patients atteints d'une IRC et une moyenne de 3,56 pour le 2ème groupe. Le niveau de la maîtrise interne est élevé pour les patients atteints d'une IRC avec une moyenne de 3,75. Les niveaux des deux dimensions : locus de contrôle interne et externe sont moyens pour les malades atteints d'une IRA.

Conclusion

Nos patients pensent que les forces extérieures sont responsables de leurs états de santé, d'où la nécessité d'une éducation thérapeutique afin d'élever leur niveau de maîtrise interne ainsi le niveau de leur bien-être et promouvoir leur état de santé.